



PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Boletín Informativo 2023-02

18 de mayo de 2023

Riesgo de xilacina en consumo de opioides

East Wenatchee, WA: Las agencias de salud de todos los Estados Unidos están reportando un aumento de xilacina en muertes por sobredosis y en suministros de medicamentos ilegales que fueron incautados. Las Jurisdicciones de salud local (LHJ, en inglés) de la región advierten al público sobre el riesgo de xilacina en el consumo de opioides.

La xilacina, también conocida como "tranq", "droga tranq", "sueño profundo" y "droga zombi" es un sedante sintético aprobado por la Administración Federal de Medicamentos (FDA, en inglés) para el uso en la medicina veterinaria. La xilacina causa sedación y, a menudo, se mezcla con fentanilo y otras drogas ilícitas para prolongar o fortalecer la sensación de felicidad o euforia que provocan dichas drogas. **Las personas que han tenido sobredosis por opioides mezclados con xilacina no pueden ser revividas con naloxona, un tratamiento de emergencia que ayuda a revertir los efectos de una sobredosis de opioides.** Debido a que no existe tratamiento médico para contrarrestar una sobredosis de xilacina, las muertes asociadas con xilacina van en aumento. La xilacina también provoca necrosis de los tejidos (muerte prematura de las células) o descomposición de la piel (cuando es inyectada), que ocasiona la necesidad de amputar dedos, brazos o piernas para salvar la vida del individuo.

Las LHJ se encuentran monitoreando activamente los reportes locales de sobredosis por drogas junto con epidemiólogos regionales y estatales para seguir las tendencias y anticiparse al aumento de muertes por sobredosis que ocasionará la xilacina a medida que se expande su consumo entre los individuos. Actualmente, existen pocas pruebas disponibles para determinar si una persona ha estado expuesta a la xilacina o si una droga fue mezclada con esa sustancia. Al igual que con otras modas de drogas que han surgido en el pasado, nuestra única forma para detectar la aparición de una nueva droga es que se produzca un cambio en el patrón de sobredosis y muertes.

Debido a que anticipamos un aumento en las drogas que contienen xilacina en toda la región del norte central de Washington, el público en general debe dar a conocer la gravedad de la xilacina, así como la importancia de evitar usar drogas ilegales y buscar ayuda para los trastornos por consumo de sustancias. Las personas que experimentan este tipo de trastornos por uso de sustancias deben estar conscientes de que, muy probablemente, las drogas que circulan por las calles contienen xilacina. Existen servicios de tratamiento y rehabilitación disponibles para las personas adictas al consumo de opioides en toda la región del norte central de Washington y son alternativas más seguras que el uso de drogas que pueden

contener xilacina.

Los trastornos por consumo de sustancias es una epidemia que se vuelve cada vez más compleja y más mortal. Es probable que nuestros amigos, familiares, vecinos y miembros de la comunidad se vean afectados y necesiten ayuda para ellos o sus seres queridos. Las mejores intervenciones de salud pública se concentran en prevenir la enfermedad y fomentar la salud. Las LHJ reconocen que los trastornos por uso de sustancias son el resultado de lesiones, dependencia de medicamentos analgésicos prescritos de buena fe, necesidades de salud conductual y dificultad para acceder a recursos para una vida sana y saludable. Las LHJ seguirán participando y fomentando la colaboración comunitaria para hacer del norte central de Washington un lugar saludable y próspero para vivir.

###